


Посадка и выращивание косточковых культур (вишня, черешня, слива, алыча и др.)

Сроки посадки: весна (с 25 апреля до 15 мая)

осень (с 15 августа до 25 сентября) *

**саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время*

Посадка: Копают яму глубиной 50 и диаметром 80 сантиметров. В каждую яму добавляют два ведра перепревшего навоза (компоста), верхний плодородный слой земли, перемешанный с удобрениями (*ОМУ Универсал* или *ОМУ осеннее* в зависимости от сроков посадки). Перед посадкой в центр ямы вбивают кол длиной 1,5 м, к которому подвязывают саженец после посадки.



После посадки растения поливают (30 литров под каждое), в последнюю лейку добавляют **Циркон** и мульчируют сеном, опилками или свежескошенной травой.

Подкормка: В первый год подкормки можно не проводить. Для лучшего укоренения опрыскивают **Эпином**. Нельзя ни в коем случае допускать пересыхания грунта, поливы проводят при высыхании верхнего слоя грунта.

В последующие годы удобрения вносят дважды за сезон.

Весной растениям дают по ведру натуральной органики (компост или перепревший навоз), **ОМУ Универсал, Азофоска, Добавка микроэлементная удобрительная** а осенью вносят готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур. (**ОМУ осеннее, Суперфосфат, Суперфосфат двойной, Калимагnezия, Добавка микроэлементная удобрительная**)

В конце октября проводят влагозарядный полив (из расчета 60 литров под одно дерево) и обязательную побелку стволов и скелетных ветвей (**Краска садовая**). Она защитит дерево от весенних ожогов и морозобоин, а также поможет уничтожить вредителей, зимующих в коре дерева.

Защита от болезней: Самые распространенные болезни косточковых: ржавчина, коккомикоз, клостероспориоз, монилиальный ожог, плодовая гниль, вертициллезный вилт, цитоспороз.

Первая весенняя обработка -- по спящим почкам (апрель). Используют **бордосскую смесь** в виде 3% раствора (300 г на 10 л воды) или **ХОМ, Топаз**

Второе опрыскивание проводят в фазе зелёного конуса (начало распускания почек). Используют 1% раствор **бордосской смеси** (100 г на 10 л воды) либо смесь **Раек + Хорус** (в соответствии с инструкцией).

Третья обработка в фазе розового бутона (начало обособления и порозовения бутонов). Состав тот же, что и при втором опрыскивании. Если температура воздуха в этот период уже превышает +15°C, **Хорус** становится неэффективным и его заменяют препаратом аналогичного действия **Скор**.

Во время цветения применение химических препаратов запрещается. В этот период рекомендуется обрабатывать деревья биопрепаратами: **Фитоспорин М, Алирин Б, Гамаир**.

Защита от вредителей: Самые распространенные вредители косточковых: вишневый долгоносик, вишневый слизистый пилильщик, листовая тля, клещи

(красный плодовой, бурый плодовой, боярышниковый), бабочка боярышница, сливовая плодожорка, вишневая муха, златогузка (золотистый шелкопряд).

Алатар, уничтожают плодожорку, боярышницу, пилильщика и др

Биотлин, Карбофос и Актара от тли

Фуфанон, Алиот, Интавир, Профиллактин от комплекса вредителей.

Фитоверм – биопрепарат, можно использовать в период цветения.

Подготовка к зиме: Необходимо защитить ствол дерева от солнечных ожогов, морозов и грызунов. В этом помогает побелка, обвязка стволов лапником или капроновой сеткой.