


Как посадить и вырастить яблоню

Сроки посадки: весна (с 25 апреля до 15 мая)

осень (с 15 августа до 25 сентября) *

**саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время*

Посадка: Копают яму глубиной и диаметром 70-80 сантиметров. В каждую яму добавляют два ведра перепревшего навоза (компоста), ведро песка, верхний плодородный слой земли, перемешанный с удобрениями (*ОМУ Универсал* или *ОМУ осеннее* в зависимости от сроков посадки). Перед посадкой в центр ямы вбивают кол длиной 1,5 м, к которому подвязывают саженец после посадки.



После посадки растения поливают (30 литров под каждое), в последнюю лейку добавляют *Циркон* и мульчируют сеном, опилками или свежескошенной травой.

Подкормка: В первый год подкормки можно не проводить. Для лучшего укоренения опрыскивают *Эпином*. Поливы проводят не реже трех раз в месяц.

В последующие годы удобрения вносят дважды за сезон.

Весной растениям дают по ведру натуральной органики (компост или перепревший навоз), *ОМУ Универсал*, *Азофоска*, *Добавка микроэлементная удобрительная* а осенью вносят готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых

культур. (*ОМУ осеннее, Суперфосфат, Суперфосфат двойной, Калимагнезия, Добавка микроэлементная удобрительная*)

В конце октября проводят влагозарядковый полив (из расчета 60 литров под одно дерево) и обязательную побелку стволов и скелетных ветвей (*Краска садовая*). Она защитит дерево от весенних ожогов и морозобоин, а также поможет уничтожить вредителей, зимующих в коре дерева.

Защита от болезней: Самые распространенные болезни яблонь: бурая пятнистость (филлостиктоз), ржавчина, мучнистая роса, цитоспороз, парша, монилиоз и др.

Первая весенняя обработка -- по спящим почкам (апрель). Используют *бордосскую смесь* в виде 3% раствора (300 г на 10 л воды) или *ХОМ*.

Второе опрыскивание проводят в фазе зелёного конуса (начало распускания почек). Используют 1% раствор *бордосской смеси* (100 г на 10 л воды) либо смесь *Раек + Хорус* (в соответствии с инструкцией).

Третья обработка в фазе розового бутона (начало обособления и порозовения бутонов). Состав тот же, что и при втором опрыскивании. Если температура воздуха в этот период уже превышает +15°C, *Хорус* становится неэффективным и его заменяют препаратом аналогичного действия *Скор*.

Во время цветения яблонь применение химических препаратов запрещается. В этот период рекомендуется обрабатывать деревья биопрепаратами: *Фитоспорин М, Алирин Б, Гамаир*.

Защита от вредителей: Самые распространенные вредители яблонь: тля, белокрылка, листовертка, яблоневый цветоед, плодожорка, паутинный клещ и др.

Алатар, Герольд уничтожают плодожорку и листовертку

Биотлин и Актара от тли

Фуфанон, Алиот, Интавир, Профиллактин от комплекса вредителей.

Фитоверм и Клещевит – биопрепараты.

Подготовка к зиме: Необходимо защитить ствол дерева от солнечных ожогов, морозов и грызунов. В этом помогает побелка, обвязка стволов лапником или капроновой сеткой.